

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

DLP 16-8-73 567791

## EDITION DE LA STATION RHONE - ALPES

(AIN, ARDECHE, DROME, ISERE, LOIRE, RHONE, SAVOIE, HAUTE-SAVOIE)

55 Rue Mazenod 69426 LYON CEDEX 3

Tél. 60-95-87 (Postes 426 et 427)

ABONNEMENT ANNUEL : 30 F

C. C. P. LYON 9431-17

Régisseur Avances et Recettes D. D. A.

55, Rue Mazenod — 69 — LYON-3°

Lisez sur l'enveloppe de ce bulletin le numéro de votre région

1er supplément au bulletin N° 155 d'août 1973

14 août 1973

page 31

### V I G N E

BOTRYTIS - A la suite des fortes pluies du 14 au 25 juillet, des attaques virulentes de pourriture grise se sont déclarées dans de nombreux vignobles, notamment dans le Bugey, le Grésivaudan et la Savoie et il semble actuellement qu'aucun secteur ne soit absolument indemne.

Lorsque la maladie est présente dans chaque grappe il est très difficile en période humide de l'enrayer par des traitements chimiques surtout au stade de la véraison. On ne peut garantir ainsi la stabilisation de la situation que dans les vignes modérément ou peu atteintes. Dans ces mêmes cas, la lutte contre la 3ème génération des vers de la grappe constitue une garantie supplémentaire contre la propagation de botrytis.

OIDIUM - Les dernières nuits tièdes ayant été favorables à cette maladie, il y a lieu de maintenir la protection sur tous les cépages sensibles.

VERS DE LA GRAPPE - Bien que la 3ème génération d'eudémis paraisse peu abondante, elle constitue, si faible soit elle, un facteur favorable à la propagation de botrytis. Aussi un traitement devra être appliqué dans la période critique qui se situera autour du 20 août en toutes régions sauf dans la tranche d'altitudes les plus élevées des vignobles où cette génération n'apparaîtra que plus tard.

### ARBRES FRUITIERS

TORDEUSE ORIENTALE DU PECHER - La population de papillons restant importante, la protection devra être maintenue en toutes régions. ~~sur pêches tardives, poires puis pommes.~~

EARPOCAPSE (poires et pommes) - A l'exception des régions 3, 6, 10, 62, 64, 69, 70, 83, 90, 106, 113, 114, 118 et 148 où le risque est actuellement très réduit, le maintien de la protection s'impose partout (2ème génération ou fin de 1ère génération) par un avant dernier ou dernier traitement entre le 17 et le 20 août, ou un peu plus tard si le précédent, appliqué depuis le 8 août, n'a pas été entraîné par les pluies. Respecter les limites légales.

Sur noix toutefois, en raison de la lignification rapide, les traitements ne sont plus nécessaires.

POU DE SAN JOSE (zones contaminées) - Le 1er traitement contre la 2ème génération devra se situer autour du 20 août au sud de Tain-Tournon, entre le 25 août et le 5 septembre (sauf avis ultérieur contraire) du sud au nord en amont de cette limite.

### CULTURES DIVERSES

OIDIUM DU CASSISSIER - Des périodes chaudes successives survenant après les fortes pluies de juillet imposent la reprise des traitements.

MILDIOU DE LA TOMATE - La dernière période de chaleur permet de repousser le prochain traitement aux 4 jours suivant la prochaine pluie ou irrigation ayant entraîné une humectation prolongée.

L'Ingénieur d'Agronomie chargé  
des Avertissements agricoles  
P. LATARD

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie  
Chef de la Circonscription  
A. PITHIoud